

enormemente dilatata la domanda di *legna da ardere* e di *carbone vegetale*: i prezzi sono fortemente rincarati; citiamo come esempio le quotazioni seguenti del mercato di Genova per quintale, notando che per qualche altra piazza il rincaro è stato anche più pronunciato:

	dicembre 1915	dicembre 1916	dicembre 1917
legna di rovere, cerro e pioppo, 1 ^a qualità (con scorza) L.	5-5.50	6-6.50	11-12
legna di rovere, cerro e pioppo, 2 ^a qual. »	4.50-4.75	5,50-6	10-11
legna di pino »	4.50-4.75	—	10
legna di olivo nostrale »	4.50-4.75	—	11-11.50
carbone spacco e cannella »	15.50-16.50	28-30	38-40

Per il *frumento* l'annata 1917 presenta come caratteristica la diminuzione nella produzione per molti paesi minori produttori, compensata però dal raccolto relativamente cospicuo di alcuni grandi produttori, fra cui l'India e l'Argentina: per l'Argentina ci riferiamo però al raccolto 1917-18, che influisce sul commercio granario 1917 solo verso la fine per le prospettive, mentre che invece il raccolto 1916-17 è stato eccezionalmente esiguo. Le condizioni meteoriche sono state in genere per la campagna 1916-17 poco propizie, ma molta influenza sullo svolgimento della coltura hanno gli svariati fattori rampollanti dalla guerra e ripetutamente commentati in questi annuari. Malgrado la propaganda svolta attivamente in molti paesi e i provvedimenti vari adottati dagli Stati per promuovere l'estensione della coltura granaria, questa ha subito una nuova sensibile contrazione; sembra che col decorrere degli anni di guerra si accentui la tendenza alla diminuzione della fertilità del terreno per effetto del minore impiego di sostanze concimanti.

L'Istituto internazionale di agricoltura ha raccolto dati statistici sulla produzione del frumento in molta parte dei due emisferi, esclusi alcuni paesi per i quali i dati mancano prevalentemente per causa della guerra (Germania, Austria, Ungheria, Belgio, Bulgaria, Portogallo, Rumania, Russia, Chili); prescindendo da tali paesi, anche riguardo agli anni precedenti, si hanno le cifre seguenti indicanti la produzione in migliaia di quintali e la superficie coltivata in migliaia di ettari:

	Produzione			Superficie coltivata
	Emisfero nord	Emisfero sud	Totale	
1917 e 1917-18	509 823	100 474	610 297	66 734
1916 e 1916-17	526 447	64 986	591 433	69 650
Media 1914-16 e 1914-15 a 1916-17	600 281	74 528	674 809	70 478

Il raccolto di quest'anno è dunque leggermente superiore a quello dell'anno precedente ed è molto inferiore alla media triennale: esso rappresenta rispettivamente il 103.3 % e il 90.4 %; quanto alle superfici seminate, il rapporto è rispettivamente 95.8 e 94.7 %: in con-