

**Tabella 20: TERAPIA ANTIDIABETICA NELLA POPOLAZIONE DIABETICA PER CLASSE DI ETÀ, ANNO 2013**

Fascia Età		00-19	20-34	35-49	50-64	65-79	80-94	>=95	Totale
		(N = 1.169)	(N = 2.524)	(N = 12.602)	(N = 53.804)	(N = 107.423)	(N = 47.834)	(N = 945)	226.301
ATC7		% su fascia	% su fascia	% su fascia	% su fascia	% su fascia	% su fascia	% su fascia	
A10A B01	INSULINA (UMANA)	14,88%	4,75%	1,90%	1,01%	1,28%	2,28%	5,29%	1,59%
A10A B04	INSULINA LISPRO	38,92%	26,55%	13,20%	6,83%	7,32%	9,22%	10,16%	8,32%
A10A B05	INSULINA ASPART	41,75%	35,90%	15,74%	8,25%	8,15%	8,80%	7,72%	9,22%
A10A B06	INSULINA GLULISINA	6,07%	10,18%	6,88%	4,68%	4,41%	4,66%	4,23%	4,74%
A10A C01	INSULINA (UMANA)	0,34%	0,44%	0,27%	0,15%	0,28%	0,53%	1,06%	0,31%
A10A C04	INSULINA LISPRO	1,28%	4,52%	2,61%	1,26%	1,54%	1,48%	0,85%	1,55%
A10A D01	INSULINA (UMANA)	0,09%	0,08%	0,10%	0,04%	0,13%	0,37%	1,48%	0,16%
A10A D04	INSULINA LISPRO	5,39%	0,99%	0,87%	0,74%	1,06%	1,76%	1,80%	1,15%
A10A D05	INSULINA ASPART	3,93%	5,71%	2,71%	1,71%	2,02%	2,99%	3,17%	2,25%
A10A E04	INSULINA GLARGINE	66,30%	52,22%	28,00%	17,30%	16,62%	17,37%	13,85%	18,22%
A10A E05	INSULINA DETEMIR	9,15%	7,69%	6,06%	5,17%	4,75%	4,00%	2,12%	4,81%
A10BA02	METFORMINA	13,86%	30,31%	63,78%	73,48%	64,23%	42,97%	25,50%	61,11%
A10BB01	GLIBENCLAMIDE	0,43%	0,28%	0,43%	0,74%	1,04%	1,43%	1,16%	1,01%
A10BB02	CLORPROPAMIDE						0,00%		0,00%
A10BB07	GLIPIZIDE			0,05%	0,11%	0,24%	0,37%	0,85%	0,22%
A10BB08	GLIQUIDONE			0,02%	0,18%	0,42%	0,91%	1,27%	0,44%
A10BB09	GLICLAZIDE	0,17%	1,90%	6,47%	10,50%	14,03%	16,83%	16,72%	13,17%
A10BB12	GLIMEPIRIDE	0,09%	2,46%	6,82%	11,23%	12,85%	11,81%	9,85%	11,77%
A10BD01	FENFORMINA E SULFONAMIDI				0,01%	0,04%	0,10%	0,11%	0,04%
A10BD02	METFORMINA E SULFONAMIDI		0,67%	4,25%	8,21%	11,20%	13,36%	11,85%	10,39%
A10BD05	METFORMINA E PIOGLITAZIONE		0,36%	2,80%	3,82%	2,65%	0,96%	0,21%	2,53%
A10BD06	GLIMEPIRIDE E PIOGLITAZIONE			0,14%	0,25%	0,20%	0,08%		0,18%
A10BD07	METFORMINA E SITA GLIPTIN	0,09%	0,99%	4,51%	5,65%	3,12%	0,66%	0,21%	3,22%
A10BD08	METFORMINA E VILDA GLIPTIN	0,09%	0,24%	1,63%	2,12%	1,21%	0,31%	0,11%	1,24%
A10BD11	METFORMINA E LINAGLIPTIN		0,08%	0,44%	0,38%	0,20%	0,04%		0,22%
A10BF01	ACARBOSIO	0,09%	1,11%	2,59%	3,33%	3,67%	3,86%	3,07%	3,52%
A10BG03	PIOGLITAZIONE	0,09%	0,59%	1,89%	2,50%	2,11%	1,14%	0,32%	1,95%
A10BH01	SITA GLIPTIN	0,09%	1,55%	3,89%	4,66%	3,51%	1,80%	0,85%	3,39%
A10BH02	VILDA GLIPTIN		0,08%	0,54%	0,67%	0,67%	0,50%	0,32%	0,61%
A10BH03	SAXAGLIPTIN		0,28%	0,93%	1,01%	0,53%	0,10%		0,57%
A10BH05	LINA GLIPTIN			0,01%	0,01%	0,01%	0,01%		0,01%
A10BX02	REPAGLINIDE	0,09%	0,79%	3,76%	6,04%	10,85%	18,25%	24,34%	10,76%
A10BX04	EXENATIDE		0,12%	0,74%	0,59%	0,23%	0,01%		0,29%
A10BX07	LIRA GLUTIDE	0,09%	1,35%	4,09%	3,19%	0,91%	0,06%		1,45%

In accordo con le linee guida, il trattamento è dipendente dall'età della persona con diabete, oltre che da altre caratteristiche cliniche. Si rileva come glicazide e repaglinide siano gli ipoglicemizzanti orali più utilizzati negli anziani in Piemonte.