

**Tabella 47: UTILIZZO DELLE STRUTTURE SANITARIE DA PARTE DELLA POPOLAZIONE DIABETICA.**

Anno Rilevazione	N Diabetici	Prevalenza
<b>2011</b>	268.261	5,32%
<b>2012</b>	276.061	5,42%
<b>2013</b>	282.286	5,46%

Anno	Almeno una prescrizione di un farmaco qualsiasi		Almeno un ricovero per qualsiasi causa		Almeno una prescrizione di una prestazione specialistica	
	N	%	N	%	N	%
<b>2011</b>	259.635	96,78%	62.316	23,23%	247.239	92,16%
<b>2012</b>	266.395	96,50%	61.703	22,35%	253.493	91,82%
<b>2013</b>	272.211	96,43%	60.852	21,56%	258.787	91,68%

Rispetto ai non diabetici di pari età e sesso, le persone con diabete seguite dallo stesso medico curante hanno utilizzato più farmaci (+16.9%), più confezioni di farmaci non antidiabetici, (+100%), ha richiesto un maggior numero di prestazioni (+ 110%), uno su 5 ha avuto almeno un ricoverato ospedaliero (+ 54.2%), e la durata della degenza è stata più lunga (+ 8%) (tabella 39).